







Junta de Andalucía

FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD









OBJETIVOS

Al finalizar el curso el alumnado tendrá que ser capaz de:

- •Conocer los protocolos de RCP en la situación actual de pandemia por COVID-19
- •Conocer las medidas de protección personales a la hora de auxiliar a una víctima
- Evaluar al paciente inconsciente (víctima)
- •Evaluar de forma segura la presencia o ausencia de respiración
- Realizar compresiones torácicas de calidad
- Utilizar correctamente un desfibrilador externo automatizado
- Colocar en posición lateral de seguridad al paciente inconsciente que respira
- Actuar en caso de atragantamiento.











EPIDEMIOLOGÍA

Introducción

- En Europa hay una parada cardíaca cada 45 segundos.
- Es vital la realización de reanimación cardiopulmonar (RCP) por la ciudadanía antes de la llegada del servicio de emergencias.
- Iniciar la resucitación temprana y efectuar una desfibrilación precoz (en 1-2 minutos) puede mejorar en más de un 60% la supervivencia














EPIDEMIOLOGÍA













CADENA DE SUPERVIVENCIA



Reconocimiento precoz y pedir ayuda para prevenir la parada cardiorrespiratoria RCP precoz para ganar tiempo Desfibrilación precoz para reiniciar el corazón Cuidados postresucitación para restaurar la calidad de vida





IAVANTE






MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Higiene de manos.

Colocación de EPI:

- Póngase mascarilla quirúrgica
- Ponga una mascarilla a la víctima. Utilice un trapo o toalla en caso de no contar con mascarilla adicional.
- Póngase guantes de nitrilo, en caso de contar con ellos













MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

¡Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias! Si no, utilice la solución alcohólica

Duración de todo el procedimiento: 40-60 segundos

¿CÓMO REALIZAR EL **LAVADO DE MANOS?**

Realizar Antes y Después del equipo de protección individual y tocar a la víctima



Mójese las manos con agua;



Deposite en la palma de la mano una



cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos;



Frótese las palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados



una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos:



Frótese la palma de la mano derecha

contra el dorso de la mano izquierda

entrelazando los dedos y viceversa:

Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa;



Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa;























ALGORITMO

EN SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID-19

SVB + DEA









IAVANTE





COMPRUEBE LA RESPUESTA

Acercamiento seguro:

- •Acercarse con cuidado con el equipo de protección individual colocado.
- •No hay peligro para usted, ni para la víctima, ni para los testigos.
- •Tenga en cuenta los peligros de: electricidad, gas, tráfico, materiales de derrumbe...
- •Coloque mascarilla a la víctima en caso de no contar con ella.

Reconocer conciencia:

- Sacuda por los hombros.
- •Pregunte:

¿Está usted bien?















SI NO RESPONDE NO MANIPULE LA VÍA AÉREA

Si no ha la hecho anteriormente, cubra la nariz y boca de la víctima y:

Mire

si la caja torácica se eleva con respiración normal

No tardar más de 10 segundos.













112 o 061











O SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN ANTE LA PANDEMIA POR COVID - 19 5ª EDICIÓN



Víctima inconsciente que no respira



Iniciar maniobras RCP











INICIAR COMPRESIONES TORÁCICAS

COMPRESIONES TORÁCICAS 100/120 min a 5-6 cms de profundidad
















CUANDO LLEGA EL **DEA**

- Encender.
- Retirar ropa del pecho.
- Colocar parches según posición mostrada.
- 4. Seguir instrucciones, alejado de la víctima durante el análisis.
- Si descarga NO INDICADA → continuar COMPRESIONES













NOO TÚ TAMBIÉN PUEDES FALVAR UNA VIDA

DEA: DESCARGA INDICADA

•Sepárese.

•Descarga segura:

- Secar pecho si estuviera mojado.
- Pecho con mucho vello: rasurar.
- Retirar apósitos/vendajes y parches de medicación del pecho.
- Si marcapasos colocar parches del DEA al lado o por debajo.
- Retirar joyas metálicas o aparatos de "piercing".
- Seguridad reanimador y de testigos.
- •Reinicie compresiones tras descarga (100-120/min).

















HASTA CUANDO CONTINUAR

Hasta que....

Un profesional sanitario le diga que pare

La víctima esté definitivamente:

- Despierta
- •Se mueve
- Abre los ojos
- Respira con normalidad

Coloque victima en postura lateral de seguridad hasta llegada equipo emergencias

Usted esté agotado











SI ESTÁ INCONSCIENTE

PERO RESPIRA CON NORMALIDAD

Coloque a la víctima en posición lateral de seguridad













Junta de Andalucía







OVACE-ATRAGANTAMIENTO:

OBSTRUCCIÓN SEVERA

Golpes en la espalda

Compresiones abdominales: Mano próxima al cuerpo con puño cerrado















OVACE-ATRAGANTAMIENTO:

ALGORITMO

OBSTRUCCIÓN GRAVE

CONSCIENTE

5 GOLPES EN LA ESPALDA

5 COMPRESIONES ABDOMINALES

INCONSCIENTE

ACTIVAR AL SEM

INICIE COMPRESIONES TORÁCICAS

OBSTRUCCIÓN LEVE

CONSCIENTE

ANIME A TOSE

CONTINUE VIGILANDO LA SITUACIÓN CLÍNICA









¿PREGUNTAS?









RESUMEN

Ahora podéis:

- Tomar la medidas de protección adecuadas antes de realizar una RCP.
- •Evaluar al paciente inconsciente (víctima).
- Realizar compresiones torácicas de gran calidad y respiraciones de rescate.
- Utilizar correctamente un desfibrilador externo automatizado.
- Colocar en posición lateral de seguridad al paciente inconsciente que respira.
- Actuar en caso de atragantamiento.











© IAVANTE.

Presentación propiedad de IAVANTE cedida para la formación de estudiantes de centros de educación primaria y secundaria.

Está prohibido cualquier uso de este material didáctico para otros fines.



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD





