

The Conversation

La chispa de la vida: ¿que es un desfibrilador externo semiautomático y quién puede utilizarlo?

Cada año se producen en España **entre 15 000 y 25 000 paradas cardíacas** [<https://www.cercp.org/area-ciudadana/area-ciudadana-2>] susceptibles de ser reanimadas fuera del entorno sanitario. Menos del 30% de los pacientes que las sufren llegan con vida al hospital. Ahora bien, estos son fenómenos potencialmente reversibles mediante técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar.

Las probabilidades de sobrevivir tras una parada cardíaca fuera del hospital dependen de múltiples variables.

Una reanimación de calidad hecha antes de la llegada de los servicios de emergencias, así como la desfibrilación precoz son las intervenciones que más pueden influir en el pronóstico de la parada cardíaca. Eso sí, con independencia de otros factores.

Hace más de una década, la legislación e implantación de los primeros **planes de desfibrilación para personal no sanitario** [

https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/Informe_uso_Desfibriladores_sep_07.pdf] supuso una importante apuesta en la optimización del manejo de la parada cardíaca.

Ver noticia completa

[<http://cardioprottegida.malaga.eu/export/sites/cardio/.galleries/DOCUMENTOS-Documentos-noticias/THECONVE>]

1474.26 Formato: pdf



El interior de un vehículo de la Policía Nacional en Málaga. / M. H.